






✓  
251  
Presentation copy from  
the author

















Al Signor Cesare Piovano,  
uno degli amici più cari del com-  
pianto mio Luigi che divide le  
trepidezze e le gioie che venivano  
procurate dalla coltura appassionata  
della storia de' libri antichi.

Per tali servizi mi professo anch'io  
di Lei

Alf. Amico

Maggio 9. 1892. Costanza Pozzi W. Angiolini




MVSCVLORVM HVMANI COR,  
PORIS PICTVRATA DISSECTIO  
PER IOANNEM BAPTISTAM  
CANANVM FERRARIEN,  
SEM MEDICVM, IN BAR,  
THOLOMEI NIGRISO,  
LI FERRARIENSIS  
PATRITII  
GRATIAM, NVNC PRIMVM  
IN LVCEM EDITA.



*Jacobi bonifati ap<sup>ta</sup> Canani munere.*



MUSCULORVM HVMANI COR-  
PORIS PICTURATA DISSECTIO  
PER IOANNEM BAPTISTAM  
CANANVM FERRARIEN-  
SEM MEDICVM IN BAR-  
THOLOMEI NIGRIS  
II FERRARIENSIS  
PATRII  
GRATIAM, NVNC PRIMUM  
IN LUCEM EDITA.



*Facile habetur in*



BARTHOLOMEO NIGRISOLO

FERRARIEN. PATRITIO IO

ANNES BAPTISTA CA

NANVS FERRARI

ENSIS MEDI

CVS. S. D.

**G**alenus Pergamenus Medicorum omnium post Hippo-  
cratem facile princeps, inter alia singulari, ac rar-  
a eruditione repleta commentaria, quae in amicorum  
gratiam et medentium usum composuit, & veterum quoque  
vix egeris, id est dissectionis administrationes, primum quid-  
dem duobus voluminibus comprehensas, Vt Flauio Boe-  
thio Romanorum consuli viro anatomicae speculationis maxis-  
me cupido more gereret, conscripsit, Secundo autem, post Boe-  
thi obitum, alias (quae aliqua ex parte extant) longe illis  
uberiores, amicorum precibus compulsus, exaravit. In quibus  
modam, ac ordinem dissecandarum Simiae partium,  
utpote animalis homini quam simillimi, plenissime docuit.  
Cum itaque, et tu Bartholomee Nigrisole, Nobilissime pa-  
riter, et doctissime, non minus anatomicae speculationis de-  
siderio nunc ardeas, quam Flavius ille Boethus vir consu-  
laris olim arserit, Et nobis humana corpora dissecantibus saepe  
affueris, quantaque necessitatis ac utilitatis in re medica  
(praesertim quae manu medetur) sit anatomes peritia, non so-  
lum ex Galeni testimonio, verum et oculis ipsis perspexeris,



videasq; nostræ tempestatis chirurgos, maiori ex parte, dissectionum imperitos, ad propterea exitio hominibus plerumq; potius, quam saluti esse conspicias, sepiissime nos hortari nō destitisti, ut humani corporis partes, nostræ opera, picturis expressas in lucem ederemus. Sic enim fieri posse arbitrabaris, ut qui rem medicam profitentur et ex dissectionū oculis lata inspectione corporum partes agnoscere nō possunt, si ex pictura saltem aliquam illarū cognitionem haberent, tutius humanæ saluti consulere valerent. Cui tam crebræ tamq; saluberimæ exhortationi tuæ diutius repugnare, ac obsistere non potuimus, tanta enim est humanitas tua, tantaq; tuorū erga me meritorū magnitudo, ut me quippiā tibi negare piaculum putem. Variæ igitur cum sint hominum partes, nullæ tamen sunt, quæ magis rerum extrinsecarum appulsu ledantur iis, quæ muscoli dicuntur, Muscoli enim vulnerantia, pungentia, tudentia vè, primi excipiunt, eam ob rem hos ipsos eleganti pictura, per Hieronymum Carpensē, pictorē nostro ævo non minus diligentem, quā insignem, delineatos, in tui gratiam, et hominum salutem, edere decreuimus. Prodeunt itaq; tuis auspitiis, et in lucem exeunt, vir ornatiissime, humanorum artuum muscoli, quos, quanta valuius diligentia, Antonio Mario Canano Ferrariensi Medico, mihi arctissima consanguinitate coniuncto monstrante; dissecuimus, et Typis excudi curauimus, eosq; nunc tui nominis immortalitati dicamus, opus autem hoc nostrum lecaturos oratos velim, ne ipsum prius damnet, quā cum re ipsa



sa, sæpè inspiciendo, id contulerint. Sic enim arbitror ipsos, conatus nostros boni pòtius consulturos, quàm in eos germinum inique fracturos.

Vale.



## CANDIDO LECTORI.

**Q**Uum corpora et viua, et mortua secari possint, utrunq; secandi modum ex antiquioribus aliqui (celaso referente) vituperarunt, Primum, veluti crudelem et medico, humane salutis præsidi, non conuenientem, viuorum quippe hominum aluum, atq; precordia incidere, laetrocinantis potius medici esse putabant, quàm qualia sint hominis interiora discere cupientis, cum præsertim ex his, quæ tanta violentia querantur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere, Nam color, mollities, durities, leuitas, asperitas, talia non sunt inciso corpore, qualia integro fuere, quoniam si corpora inuiolata, metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, milleq; aliis affectibus quibus obnoxia sunt mutantur, multo magis interiora, quibus maior mollities, et lux ipsa noua existit, sub grauissimis vulneribus et ipsa trucidatione mutantur, stultumq; videtur, quale quidque viuo homini est, tale morienti, imo iam mortuo, esse existimare, si quid tamen sit, quod spirante adhuc homine, aspectui subiiciatur, id casus sæpe curantibus offert, contingit enim interdum hominem sic vulnerari, ut interior aliqua pars nudetur, et in alio alia, vnde sedem, ordinem, figuram, magnitudinem, similiaq; alia prudens medicus per misericordiam sanitatem moliendo, quæ alii per cædem dira crudelitatem, cognoscit. Ob hoc ne alterum quidem sectionis modum, mortuorum scilicet lacerationem, necessarium esse dicebant,



qui et si non crudelis, foedus tamen existit, cum aliter plæ  
raque in mortuis se habeant, et quæ in viuis cognosci pos  
sunt, ipsa curatio abunde demonstret. Cæterum hæc ipsa,  
corporum anatomen non verè oppugnantia illius utilitatem  
ac necessitatē agnoscetes facile confutabunt, duplex enim  
cum sit corporum dissectio, viutorum scilicet, et mortuorum.  
ex prima (si recte administratur) internarum aliquot partiū  
(et si non omnium) actionem ad earum curationes cognitu  
necessariam, agnoscemus, non quidē viuos homines secū  
do (quod crudelis, et carnificis potius hominis, quā medi  
ci esse videtur) sed bruta magis animantia, quæ quā plus  
rimis ex partibus, atq; earum functionibus homini quā si  
millima sunt, vt in renibus, vteris, vesica, vtero, intestis  
nis, tactibus, omēto, liene, ventriculo, hepate, transuerso septo,  
gulla, pulmonibus, corde, et similibus aliis, ex altera verò  
mortuorum dissectione, partium figuram, numerum, situm,  
colligationem, et actionem quandoq; (vt musculis ad origi  
nē tractis) res ad medēdi peritiā maximē necessarias disces  
re licet, Nec hoc foedum est, imo pulchrum, valdeq; conues  
niens, si laborantium partium curationem, et agnitionē, ad  
quam casus sufficere nullatenus potest, nobis ipsis præ o  
culis posuerimus, rara enim vulnera sunt, per quæ interiora ita  
aperiantur vt eorum figuram, positum, societatemq; adamus  
sim cognoscere valeas, et si casu aliquibus partibus id eue  
niat, non omnibus tamē unq; euenerit, Verum in mortuo  
rum dissectione omnes hominis partes breui tempore cognos



cimus, quas per casum homini, quantum vis laborioso, et  
prudenti, etiam si nestoreos annos viueret, cognoscere non da-  
retur. Cum igitur, et in viuorum animantium, defunctorumque  
hominum dissectione, quantum nobis per adolescentiam nos-  
tram licuit, diligenter admodum versati fuerimus, multaque  
ab antiquis iam pridem litterarum monumentis tradita ocu-  
lis ipsis perspexerimus, nonnulla etiam nostra opera adinue-  
nerimus, a communi medentium usu non aliena, dignum du-  
ximus horum aliqua medicinae sectatoribus impartiri. Hincque  
effectum est, ut Primum hunc musculorum dissectionis libe-  
rum crebris Bartholomei Nigrisoli Ferrarisen. Patritii effla-  
gitationibus impulsus ediderimus, Reliquos sub calchographi  
prelo iam positos mox edituri. Hunc itaque benigno animo  
accipias velim candide lector, tua enim benignitas perinde  
ac calcar quoddam erit, quod me ad maiora assidue impela-  
lat, Tu interim vale, deosque nobis, tantis in laboribus pro-  
pitios precare, Instituti vero nostri ita nascatur exordium.



IONNIS BAPTISTAE CANA  
NI FERRARIENSIS MED  
ICI HUMANORVM  
MUSCULORVM  
PICTVRATAE  
DISSECTI  
ONIS.

LIBER PRIMVS.

**I**N hoc primo libro Galenum sequentes Manus musculos ponemus, nomine autem manus (Hippocratis et Galeni more) vulgo dictum brachium intelligimus, quod in tres primarias partes diuiditur, extremam scilicet manum (quae absoluto nomine, manus dici solet) cubitum, et βραχιονα a Graecis appellatum, extrema manus tres habet partes, digitos videlicet, brachiale quod Graece ραγδω's nominatur, et inter hec medium, Graeci μεταρραγδω's nuncupant, nos postbrachiale dicimus. Brachium siue malis Graece dicere βραχιονα vnico osse constat, quod Celsus humerum appellauit, Cubitus vero (quem brachium nominat) duobus, quorum vnus Graece ραγι's latine radius dicitur, alter autem a Graecis quidem τωκ'us a Celso vero cubitus nominatur, At in extrema manu septem et viginti ossa existunt, octo scilicet brachialis, quatuor postbrachialis, et quindecim dis



# MVSCVLORVM ANATOMES

gitorum, quæ omnia nouisse oportet ad exactam musculorū  
in hoc primo libro depictorum cognitionem, hec pauca præ-  
fati ad propositum accedamus.

In hoc primo libro Galeni sequentes Musculus  
quos ponimus nomine autem musculus (Hæc præfatio  
Galeni more) vultus dictum brachium intelligitur, quod  
in his primis partibus, scilicet, extremitatibus, scilicet, manibus  
(quæ absolute nomine, manus dicitur) et pedibus, scilicet, pedibus  
in a Græcis appellatur, extremitates dicitur, scilicet, extremitates  
ter, digitos dicitur, brachia dicitur, scilicet, brachia dicitur, scilicet, brachia  
natur, et inter hoc medium, scilicet, inter hoc medium, scilicet, inter hoc medium  
nos postbrachiale dicitur. Brachia sunt manibus Græce dicitur  
certe, scilicet, vultus esse constat, quod Celsus humerus ap-  
pellatur, Capitis vero (quem brachium nominat) dicitur  
quorum vultus Græce dicitur, scilicet, vultus dicitur, scilicet, vultus  
a Græcis quidem, vultus a Celso vero capitis nominatur,  
At in extrema manu sequitur et vultus et existit, et  
scilicet brachia, quatuor postbrachia, et quatuor dicitur





Hac in pictura hi nu-  
dantur muscoli vides  
licet.

A. MVSCV

LVS Flectens bra-  
chiale ad minimum  
digitum.

B. MVSCV

LVS Volæ.

C. MVSCV

LVS Tendonum  
scissorum, sub quo est  
musculus habens ten-  
dines non fissos am-  
bo digitos flectunt.

D. MVSCV

LVS Flectens bra-  
chiale propè magnū  
digitum.

E. MVSCV

LVS Manum pro-  
nam faciens.

F. MVSCV

LVS. Manum su-  
pinam redens.



# MVSCVLORVM ANATOMES.



## MVSCVLVS

Volæ manus qui secundum antiquos (ut ait Galenus secundo de usu partium et primo de Anatomicis aggressionibus) flectit et ipse quinque digitos secundum ipsum autem factus est, ad firmandam cutim manus internam, melioris apprehensionis gratia, ad prohibendumque ortum pilorum, causa exquisitoris sensus. Ratio vero Galeni primo de Anatomicis aggressionibus contra antiquos est. Oportet inquit secundum antiquos tendinem musculi mouentis aliquem articulum inseri ossi illius. Ast tendo mus



Culi volæ non inseritur ossibus digitorum, igitur non potest  
 secundum eorum placita digitos mouere. Ratio autem hæc  
 licet contra antiquos sit valida, simpliciter tamē videtur in-  
 valida, Posset enim quispiam dicere, non esse necessarium  
 semper tendinem musculi mouentis articulum inseri, siue cō-  
 iūgi ossi articuli, sed sat fore si iungatur alicui cōiuncto ossi,  
 pro vt tendo huius musculi coniungitur ligamento, quod iū-  
 ctum est ossibus digitorum. Oritur hic musculus ab interno  
 brachii nodo, mediusq; procedens inter musculos carpū flec-  
 tētes, suo tendine supereminet ligamento interno, quod iun-  
 git cubitum radio, postea dilatatur illius tendo in trianguli  
 figura, cuius acumen est prope ligamentum dictum, basis  
 autem in principio postbrachialis, quæ per quinque veluti ten-  
 dines inseritur ligamento, comprehendenti aliorū digitos flec-  
 tentium musculorum tendines, Bifariam hunc tendinem li-  
 cet secare cō cute videlicet, et sine cute.





# MVSCVLORVM ANATOMES



## MVSCVLVS

Flectēs brachiale, qui  
 oritur ab interiore no  
 dō brachii, cubito ad  
 herens, inserit ossi rec  
 to, mēbraneoq; quod  
 ē regione minimi dia  
 giti, et secūdum cub  
 iti processū existit,  
 quē Greci anatomici  
 modo  $\gamma\epsilon\alpha\phi\omega\epsilon\iota\delta\eta$   
 modo  $\sigma\tau\upsilon\lambda\omega\epsilon\iota\delta\eta$  nomi  
 nabant.





<sup>c</sup>  
MVSVLVS

Flectēs brachiale pro  
pè magnum digitum,  
Oritur ab interiore  
nodo brachii obliqua  
usq; aliquantisper su  
pra cubitum tendens,  
radio protensus, inse  
ritur per tendinem of  
si postbrachialis ante  
indicem, licet primo  
aspectu videatur ina  
seri ossi brachialis pro  
pè magnum digitum.



# MVSCVLORVM ANATOMES



## MVSCVLVS

*Desinens in tendines  
fissos flectens secun-  
dum articulum digi-  
torum, præter articu-  
lum magni digiti qui  
non accipit tendinem  
ab hoc musculo, oris-  
tur ab interiore nodo  
brachii aliquàliter cu-  
bitum attingendo, in-  
seriturq; tendinibus se-  
cundo internodio qua-  
tuor digitorum, conti-  
neturq; sub ligamēto  
radio cubiti  
interna in parte con-  
stringente.*





MVSCVLVS

flectens, secundū Ga  
lenum, primū et ter  
tium articulum quatu  
or digitorū, magni au  
tē digiti tantū secun  
dum et tertium inter  
nodiū flectit, Oritur  
à partibus cubiti ius  
ta gibberum, et per  
profundiora mediam  
radii cubitiq; regionē  
vniuersam cōplexus  
utriq; ossi coheret, ac  
in tres veluti partes  
delineatus est, quarū  
vna minimum digitū  
respicit, altera indicē,  
tertia medios digitos,  
Cōtinētur huius mus  
culi tendines sub liga  
mento stringente radi  
um, et cubitū intrin  
secus, per mediasq;  
scissiones tēdinū flexo



## MVSCVLORVM ANATOMES

tenantium secundum internodium quatuor digitorum ad eorum  
extremitatem feruntur, & una cum tendinibus præcedentis,  
sub eodem ligamento à principio digitorum, usq; ad finem  
protenso sunt, per quod ligamentum vult Galenus hunc mus-  
culum flectere primum internodium digitorum quatuor, ve-  
rum non maior videtur ratio de illo, quam de hoc ipso, cum  
ipsius tendines sub eodem ligamento comprehensi sunt.





**MVSCVLI**, pro  
nam facientes manū,  
quorum alter oritur  
ex elatioribus parti-  
bus nodi interioris bra-  
chii, obliquusq; supra  
cubitum latus inseris-  
tur radio intrinsecus  
ad medias ipsius vsq;  
partes extensus. Reli-  
quus vero ex inferiori  
parte cubiti iuxta  
brachiale exortus ob-  
liquus inseritur ossi ra-  
dii, habent terminum  
carnosum & tamen  
ossa mouent, licet Ga-  
lenus Primo de motu  
musculorum scribat,  
Musculos mouentes  
ossa in tendines om-  
nino maiores vel mi-  
nores terminare. De  
propositis aut in secu-  
do de usu partiū op-  
positum asserit.



# MVSCVLORVM ANATOMES



In hac pictura hi appa-  
rēt muscoli vide  
licet.

A. Musculus ex inte-  
rioribus vnus, qnq; tē-  
dines nō fissos pducēs

B. Musculus supinā  
manum reddens.

C. Musculus brachi-  
ale ad minimum dia-  
gitum reflectens.

D. Musculus minia-  
mū digitū extendens,  
ac in latus ducens.

E. Musculus digitos  
tres extendens.

F. Musculus indicē  
in latus ducens.

G. Musculus bifidus  
magnū digitū ab aliis  
abducendo extēdens.

H. Musculus duplici  
tendine carpi euertens

I. Musculus supinam  
manum faciens.






Musculus q̄ secundum Galenum quatuor habet tēdines ad quatuor digitos præter magnū tēdētēs, re autem ipsa tantū tres habere videtur ad tres digitos iter magnū et minimū porrectos, ex quibus duo duplices apparet, tēdo scilicet indicis, et tēdo ānularis q̄ duas habet propagines, quarū vna cōiungitur tēdini ad medium digiū tēdēti, altera vero ei q̄ ad minimū digiū procedit, et ā pprio musculo originē ducit Cōtinet hic musculus sub ligamēto extrinsecus strinsgēte radius et cubitum, ortūq; habet ab exteriori nodo brachii et supra radiū p̄tēdit



# MVSCVLORVM ANATOMES.



MVSCVLVS,  
 oriens á nodo exte-  
 re brachii cubito, ra-  
 dioq; per longitudinē  
 hærens, et sub pro-  
 prio ligamento in fine  
 cubiti astrictus, suo  
 tendine ossi postbra-  
 chialis ante minimū  
 digitum insertus, bra-  
 chiale ad minimum  
 digitum extendit.






MVSCVLVS

ex nodo exteriori bra-  
chii oriens, radium &  
cubitum per longitua-  
dinem attingens, in fi-  
ne cubiti proprio liga-  
mento cōtentus in du-  
os tendines scinditur  
ad minimum digitum  
tendentes, ipsumq; in  
latus, vel in inferiora  
rem partem ab aliis  
digitis extendēdo ab-  
ducit.



# MVSCVLORVM ANATOMES



**MVSCVLVS**  
 oriens ex cubito eiꝯ  
 adherens sub cōmuni  
 ligamento stringente  
 radius et cubitū cō-  
 tentus, vnicum tendē-  
 tem ad indicem pro-  
 ducens, non duos ad  
 indicem et medium,  
 vt vult Galenus, dū-  
 cit indicem in latus.






**MVSCVLVS,**  
 Oriens ex cubito su-  
 pra eius medium, radi-  
 um attingit, sub pro-  
 prio; ligamento in fi-  
 ne radii astrictus, vni-  
 cum tendinem produ-  
 cit, per totum magnū  
 digitum protensum, et  
 in latus ipsum ducit  
 secundum Galenum.



# MVSCVLORVM ANATOMES



**MVSCVLVS**  
 ex membrana diuidē  
 te interiores musculos  
 ab exterioribus, cubis  
 toq; exortus, radium  
 ascendit, sub proprio  
 q; ligamēto, in fine ra  
 dii (vbi insculptus est  
 radius) continetur, du  
 os tendines producit,  
 quorū vnus inseritur  
 extremitati primi os  
 sis magni digiti nō p  
 cedens ad vltimam  
 eius aciem, vt voluit  
 Galenus, alter vero  
 inseritur ossi brachia  
 lis antē magnum dis  
 gitū. Poteſt hic mus  
 culus pro duobus has  
 beri, ait Galenus, per  
 alterū enim tendinem  
 brachiale ad magnum  
 digitū extēdit, p reli  
 quū verò abducit ma

gnum digitum ab aliis ipsum aliquo modo extendendo.






**MVSCVLVS,**  
 exoricens à nodo exte-  
 rior brachii suprarad-  
 dium protensus, pro-  
 prio ligamēto in fine  
 radii astrictus, bifido  
 tendine ossibus post-  
 brachialis antè indig-  
 cem, et medium dig-  
 gitos insertus totum  
 brachiale euertit.



# MVSCVLORVM ANATOMES








## MVSCVLVS

Supinam manum red-  
dens ex brachio proz  
pē medium exoriens,  
supra radium protens  
sus illi suo fine ad  
vsq; brachiale inserit



# MVSCVLORVM ANATOMES.



A. Musculi quatuor exiles orientes ex mēbranis circundantibus tendines non fissos, digitorū latera subeunt, in dextra quidē (ma-  
nu existente prona) versus sinistram in si-  
nistra autē versus dex-  
tram, habent mouere  
digitos in latus, q̄ qui-  
dē sunt in dextra ver-  
sus sinistram, et qui  
in sinistra versus dex-  
tram.

B. Musculus, oriens  
ex osse cui annectitur  
tendo musculi brachi-  
ale ad minimum dia-  
gitum flectentis, inse-  
ritur minimo digito in  
feriore in parte, et  
ipsum ab aliis digis-  
tis abducit.






C. Musculus, oriens à primo osse brachialis ppè magnū digitū cui inseritur, habet secundū Galenū abducere eū ab aliis. At videtur factus ad trahēdum potius magnū digitū versus minimū.  
 D. Musculus suo capite ossi postbrachialis antè mediū digitū affixus, obliqꝫ fibris inserit primo ossi magni digiti, habet adducere magnū digitū ad indicē interius inclinādo.  
 E. musculus, siue musculi q̄ siti sunt, supra musculū abducētē minimū digitū ab aliis, in parte interiore manus extreme, obliquis fibris cuti herent, et suis tēdinibus tendini

volē iunguntur, horum musculorū nō meminit Galenus, qui ad tēdinis volē dilationem facti videntur,



## MVSCVLORVM ANATOMES



**MVSCVLVS**  
de quo Galenus non  
meminit, qui in parte  
exteriore manus post  
brachiali antè indicē  
affixus, obliquis fibris  
ossi primo magni dis  
giti insertus, eum ad  
indicem adducit, exte  
rius inclinando, simul  
autem cum secundo  
præcedentium rectam  
adductionem facit,






Octo musculi exiles  
corpus vnū carnosum  
efficientes, ex coarticu-  
latione brachialis, cū  
postbrachiali exorti,  
binatim priori de artia-  
culationi digitorum,  
ex interioribus parti-  
bus inserti, lateraliū  
partium aliquid acci-  
pientes, simul rectam  
flexionem primi artis-  
culi faciunt, seorsum  
verò flectunt, in latus  
parū quid inclinādo.



# MVSCVLORVM ANATOMES



Hac in pictura hi nu-  
dantur muscoli vidē  
licet.


A. Musculi vlnam  
extendentes.

B. Musculi vlnā fle-  
tentes.

C. Caput musculi su-  
pinā manū reddētis.

D. Musculus cervic-  
is quem aliqui δελτ  
οειδης appellarūt quo-  
niā Δ grece litteræ fi-  
guram imitatur.






MVSCVLVS

iuxta venā humeralē  
citra confectionē com-  
spicius, duo habet ca-  
pita, vnum per patu-  
lā brachii rimam ad  
scapularum cervicis  
eminentiā procedens,  
alterum ad processum  
α' ρυγοειδῆ vel ρογο-  
ειδῆ dictū, hec capi-  
ta in idem venientia  
hunc musculū genera-  
rūt, qui nervosā exili-  
tatē faciēs, validū tē-  
dinē procreat, quo ra-  
dio inseritur, et mem-  
branosi ligaminis ar-  
ticulari aliqd accipiēs  
totū articulū attollit,  
paulatim ad interiora  
inclinando, cum mus-  
culo autē ei subiec-  
to rectam flexionem  
operatur.



# MVSCVLORVM ANATOMES



**MVSCVLVS**  
ex duobus carnosis  
principiis brachio cir-  
cundatus, vno in pos-  
teriori parte altiore,  
altero in anteriori hu-  
miliore, quæ capita in  
idem coeuntia muscu-  
lum hunc generant, q  
in nerueam desinens  
tenuitatē, in cubiti os  
insertam, flectit artia-  
culum in exteriora pa-  
ulatim inclinando, cū  
supposito autē mus-  
culo rectam flexionē  
facit,






## MVSCVLVS

ab humili latere scas-  
pularū ex dimidio fe-  
rē superioris eius par-  
tis ortus, iungitur alte-  
ri musculo, capiti bra-  
chii subdito, ambo per  
tendinē latum cuz-  
biti gibbero īserūtur,  
qui tendo duplex ap-  
paret sequēdo fibras,  
exteriorēq; partē ab  
hoc musculo accipit,  
interiorem autem ab  
altero, et si disiunctū  
vnum ab reliquo at-  
trahas, totā vt Gale-  
nus inquit, manū extē-  
des, hoc discrimine  
intercedente, quod hic  
in exteriora, alter in  
interiora aliquāliter  
deflectendo extendit.



# MVSCVLORVM ANATOMES.



## MVSCVLVS

oriens sub capite bra-  
chii, qui iungitur mus-  
culo precedēti, et alte-  
ri musculo ei subdito,  
adeo vt ipsius particu-  
la ab anatomicis puz-  
tetur, possunt tamen  
pro fibrarum rectituz-  
dine seperari, habet  
(vt ait Galenus) extē-  
dere manum totam in-  
tro oblique deflectēdo



LIBER PRIMVS.



MVSCVLVS

qui pars præcedentis  
ab Anatomicis puta  
tur, perpetuò carnos  
sus, posterioribus par  
tibus gibberi inserit,  
rectam articuli exten  
sionem facit.

LIBRI PRIMI  
FINIS.



MUSCULVS  
 qui pars præcedentis  
 ab Anatomica parte  
 in, perpetuo carnosus  
 latus posterioribus par  
 tibus gibberis insertis  
 rectam articuli exten  
 sionem facit.



LIBRI PRIMI  
 FINIS.















YALE  
MEDICAL  
HISTORICAL  
LIBRARY





217.

com/cl/e

YALE  
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL  
LIBRARY

Accession no.  
HC

Author  
Canano, G.B.  
Musculorum humani  
corporis ... Ferrara,  
Call no. 1541?

16th Cent



